

## 【定期予防接種】

| 予防接種名                                       | 対象年齢  | 標準的な接種期間                       | 回数         | 備考  |
|---|---|--------------------------------|------------|---|
| ロタ  | 1価(ロタリックス)<br>出生6週0日後から24週0日後まで                                 | 【初回接種】<br>生後2月～出生14週6日後まで      | 2回         | 接種回数はワクチンの種類によって異なります。                              |
|   | 5価(ロタテック)<br>出生6週0日後から32週0日後まで                                  |                                | 3回         |   |
| 小児用肺炎球菌                                     | 生後2か月～5歳未満  | 生後2～7か月未満                      | 1～4回       | 接種回数は開始年齢により異なります。                                  |
| B型肝炎  | 1歳未満  | 生後2～9か月未満                      | 3回         |   |
| 五種混合<br>(ジフテリア<br>百日せき<br>破傷風<br>ポリオ<br>ヒブ) | 1期初回 生後2か月～90か月未満   | 生後2～7か月未満                      | 3回         | 令和6年4月から定期接種化。五種混合を接種する場合は四種混合及びヒブの接種はありません。        |
|   | 1期追加 生後2か月～90か月未満<br>(1期初回接種(3回)終了後、6か月以上の間隔をおく)                | 1期初回接種(3回)後、<br>6～18月までの間隔をおく  | 1回         |   |
| 四種混合<br>(ジフテリア<br>百日せき<br>破傷風<br>ポリオ)       | 1期初回 生後2か月～90か月未満   | 生後2～12か月                       | 3回         |   |
|   | 1期追加 生後2か月～90か月未満<br>(1期初回接種(3回)終了後、6か月以上の間隔をおく)                | 1期初回接種(3回)後、<br>12～18月までの間隔をおく | 1回         |   |
| ヒブ  | 生後2か月～5歳未満  | 生後2～7か月未満                      | 1～4回       | 接種回数は開始年齢により異なります。                                  |
| BCG   | 1歳未満  | 生後5～8か月                        | 1回         |   |
| 麻しん風しん混合                                    | 1期 生後12か月～24か月未満  |                                | 1回         |   |
|   | 2期 5歳以上7歳未満の人であって小学校入学年度1年前の4月1日から翌年3月31日までの間にある人(保育園・幼稚園等の年長児) |                                | 1回         |   |
| 水痘<br>(みずぼうそう)                              | 生後12か月～36か月未満   | 生後12～15か月                      | 1回目        |   |
|   |   | 1回目の接種終了後6～12月までの間隔をおく         | 2回目        |   |
| 日本脳炎  | 1期初回 生後6か月～90か月未満<br>(1期初回間隔…6日以上)                              | 3歳                             | 2回         | H7.4.2～H19.4.1生まれの方は、20歳に達するまでの間、1期・2期の未接種分が受けられます。 |
|   | 1期追加 生後6か月～90か月未満<br>(1期初回終了後、6か月以上の間隔をおく)                      | 4歳                             | 1回         |   |
|   | 2期 9歳～13歳未満   | 小学校4年生(9歳)                     | 1回         |   |
| 二種混合<br>(ジフテリア、破傷風)                         | 2期 11歳・12歳  | 小学校6年生(11歳)                    | 1回         |   |
| 子宮頸がん                                       | 接種日に小学6年生～高校1年生に相当する年齢  | 中学1年生(13歳相当)の女子                | 3回<br>(2回) | ワクチンの種類によって接種回数、接種間隔が異なります。                         |