

【定期予防接種】

令和4年(2022年)4月1日現在

予防接種名	対象年齢	標準的な接種期間	回数	備考
ヒブ	生後2か月～5歳未満	生後2～7か月未満	1～4回	接種回数は開始年齢により異なります。
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	生後2～7か月未満	1～4回	接種回数は開始年齢により異なります。
B型肝炎	1歳未満	生後2～9か月未満	3回	
ロタ	1価(ロタリックス) 出生6週0日後から24週0日後まで	【初回接種の標準的な接種期間】 生後2月～出生14週6日後まで	2回	接種回数はワクチンの種類によって異なります。2回目以降は27日以上の間隔をおいて接種します。
	5価(ロタテック) 出生6週0日後から32週0日後まで		3回	
四種混合 〔ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ〕	1期初回 生後3か月～90か月未満	生後3～12か月	3回	間隔…20日以上
	1期追加 生後3か月～90か月未満 (1期初回接種〈3回〉終了後、 6か月以上の間隔をおく)	1期初回接種(3回)後、 12か月～18か月	1回	
BCG	1歳未満	生後5～8か月	1回	
麻しん風しん混合	1期 生後12か月～24か月未満		1回	
	2期 5歳以上7歳未満の人であって小学校入学年度の1年前の4月1日から翌年3月31日までの間にある人(保育園・幼稚園等の年長児)		1回	
水痘(みずぼうそう)	生後12か月～36か月未満	生後12か月～15か月	2回	2回目の接種は、1回目の接種終了後6月から12月までの間隔をおく。
日本脳炎	1期初回 生後6～90か月未満	3歳	2回	1期初回間隔…6日以上 H7.4.2～H19.4.1生まれの方は、20歳に達するまでの間、1期・2期の未接種分が受けられます。
	1期追加 生後6～90か月未満 (1期初回終了後、6か月以上の間隔をおく)	4歳	1回	
	2期 9歳～13歳未満	小学校4年生(9歳)	1回	
二種混合 (ジフテリア、破傷風)	2期 11歳・12歳	小学校6年生(11歳)	1回	
ポリオ	初回：生後3～90か月(7歳6か月)未満	生後3～12か月	3回	
	追加：生後3～90か月(7歳6か月)未満	初回接種(3回)後12～18か月	1回	
ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん)	接種日に小学6年生～高校1年生に相当する年齢	中学1年生(13歳相当)の女子	3回	
	平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれ		3回	過去に子宮頸がんワクチンの接種を合計3回受けていない女性